



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 381 от « 24 » июня 2014 г.

Настоящее свидетельство выдано
«Агро-Кеми Кфт.»

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Кинмикс, КЭ (50 г/л бета-циперметрина)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 262-01-398-1

на срок по « 23 » июня 2024 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А. Чекмарев

(подпись)



М. П.



№ 000423

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,2-0,3	Пшеница яровая и озимая	Клоп-вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	20(2)
0,2		Блошки, цикадки, тли, трипсы, пьявицы		
		Ячмень		
0,15-0,2	Картофель	Колорадский жук		20(2)
0,2-0,3	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль		
		Рапс		
		Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки		20(2)
0,3-0,4	Люцерна	Долгоносики, клопы, тли		40(1)
0,4-0,6	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовёртки, тли	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га	20(2)
0,24-0,4		Яблонная медяница, яблонный цветоед	Опрыскивание в период бутонизации. Расход рабочей жидкости – 600-1000 л/га	
0,32-0,48	Слива, черешня, вишня	Тли	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га	30(2)
0,5-0,6	Пастбища, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 20 дней после обработки. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	-(1)



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида
Кинмикс, КЭ (50 г/л бета-циперметрина) от 24 июня 2014 г. № 381

Для личных подсобных хозяйств:

Норма применения препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1,5-2,0 мл/100 м ²	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 4 л/100 м ²	20(1)
2,0-3,0 мл/100 м ²	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль		
4 мл/10 л воды	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки, тли	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения. Расход рабочей жидкости – до 5 л/дереву	20(2)
		Яблонная медяница, яблонный цветоед	Опрыскивание в период бутонизации. Расход рабочей жидкости – до 3 л/дереву	
	Крыжовник	Пилильщики, тли	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения. Расход рабочей жидкости – 0,5-1,0 л/куст	
	Смородина	Листовертки, тли		
	Слива, черешня, вишня	Тли	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения. Расход рабочей жидкости – до 3 л/дереву	30(2)

Сроки выхода для проведения ручных и механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата:

авиационным методом.

в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов.

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А. Чекмарев

